

Písomná informácia pre používateľa

NiQuitin Freshmint 2 mg liečivé žuvačky NiQuitin Freshmint 4 mg liečivé žuvačky

nikotín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal zdravotnícky pracovník.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka napr. lekára, zdravotnú sestru, poradcu na odvykanie od fajčenia alebo na lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak nebudeste schopný odvynkúť si od fajčenia do 9 mesiacov liečby NiQuitin Freshmint 2 mg liečivými žuvačkami alebo NiQuitin Freshmint 4 mg liečivými žuvačkami, musíte sa obrátiť na lekára.
- V celej písomnej informácii sa NiQuitin Freshmint 2 mg liečivé žuvačky a NiQuitin Freshmint 4 mg liečivé žuvačky uvádzajú pod skráteným názvom NiQuitin Freshmint.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je NiQuitin Freshmint a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NiQuitin Freshmint
3. Ako používať NiQuitin Freshmint
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať NiQuitin Freshmint
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je NiQuitin Freshmint a na čo sa používa

NiQuitin Freshminta používa na podporu odvykania od fajčenia. Tento spôsob liečby sa nazýva náhradná liečba nikotínom alebo NLN.

Práve nikotín obsiahnutý v cigaretách u vás môže vyvoláť fyzickú závislosť od cigaret.

- NiQuitin Freshmint vám pomôže prestať fajčiť tak, že nahradí časť nikotínu, ktorý sa vám dostáva do tela z cigaret.
- Nikotín zo žuvačiek NiQuitin Freshmint zmierňuje niektoré nepríjemné príznaky, ktoré fajčiarí môžu pocíťovať, keď sa pokúšajú prestať fajčiť. Medzi takéto príznaky patrí pocit choroby alebo podráždenosti.
- Nikotín môže taktiež zmierniť vašu chuť na cigaretu a pomôže vám odolať nutkaniu fajčiť.

Používanie žuvačiek NiQuitin Freshmint sa nespája so zdravotnými rizikami, ktoré vyplývajú z fajčenia tabaku, pretože neobsahujú decht, oxid uhľnatý ani ďalšie toxíny obsiahnuté v cigaretovom dyme. Niektorí ľudia sa obávajú, že keď prestanú fajčiť, môžu sa namiesto toho stať závislými od nikotínových žuvačiek. Stáva sa to veľmi zriedkavo a ak by sa to predsa len stalo, je to menej škodlivé ako pokračovanie vo fajčení. Taktiež sa od žuvania dá ľahšie odvynkúť.

Šanca, že sa vám podarí odvynkúť si od fajčenia, sa zvýši, keď sa zúčastníte na podpornom programe. Tieto programy „stop fajčeniu“ pomáhajú fajčiarom zmeniť ich návyky. O programoch na odvykanie od fajčenia informujte sa u svojho zdravotníckeho pracovníka alebo lekárnika.

Fajčenie nemá žiadne zdravotné prínosy. Vždy je lepšie prestať fajčiť. Použitie náhradnej liečby nikotínom (ďalej len NLN), napríklad vo forme žuvačiek NiQuitin Freshmint, vám v tom môže pomôcť. Všeobecne platí, že akékoľvek možné vedľajšie účinky súvisiace s NLN sú oveľa menšie ako dobre známe riziká, ktorým by ste boli vystavení pri pokračovaní vo fajčení.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NiQuitin Freshmint

Nepoužívajte NiQuitin Freshmint

- ak ste alergický na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte menej ako 12 rokov.
- ak ste nefajčiar alebo príležitostný fajčiar.

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať NiQuitin Freshmint, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka:

- ak ste nedávno prekonali srdcový záchvat alebo náhlú cievnu mozgovú príhodu, alebo ak trpíte závažnou poruchou srdcového rytmu, nestabilnou alebo zhoršujúcou sa anginou pectoris (bolešťou na hrudníku), vysokým krvným tlakom, ktorý sa nedarí upraviť pomocou liekov, alebo nestabilnou angínou pectoris (pokojuvou hrudníkovou angínou), pokúste sa skoncovať s fajčením bez použitia nikotinovej substitučnej terapie, pokiaľ vám lekár výslovne neodporučí ich použitie.
- ak máte cukrovku, je potrebné, aby ste si na začiatku liečby žuvačkami NiQuitin Freshmint kontrolovali hladiny cukru v krvi častejšie ako zvyčajne. Môžete potrebovať zmenu dávky inzulínu alebo liekov proti cukrovke.
- ak ste niekedy mali alergické reakcie prejavujúce sa opuchom pier, tváre a hrdla (angioedém) alebo svrbivou kožnou vyrážkou (žihľavka). Používanie NLN môže niekedy vyvolať takýto typ reakcie.
- nikotínová žuvačka môže uvoľniť zubné výplne alebo implantáty
- ak ste v minulosti mali záchvaty (epilepsia)
- náhradná liečba nikotínom (NLN) nie je vhodná pre deti do 12 rokov. Nikotín pôsobí na deti silnejšie ako na dospelých. U detí by mohol zapríčiniť závažnú otaravu, ktorá môže spôsobiť smrť.

Pri pokuse odvyknúť si od fajčenia nestriedajte žuvačky NiQuitin Freshmint s nikotínovými pastilkami.

Obráťte sa o pomoc a radu na zdravotníckeho pracovníka, ak máte:

- závažné alebo stredne závažné ochorenie pečene alebo závažné alebo stredne závažné ochorenie obličeiek, pretože je u vás vyššia pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.
- neliečenú zvýšenú funkciu štítnej žľazy alebo feochromocytóm (nádor nadobličiek, ktorý môže ovplyvňovať krvný tlak) - váš lekár by vás mal o týchto stavoch informovať - pretože nikotín môže zhoršiť príznaky týchto ochorení.
- vred žalúdka alebo dvanástnika alebo zápal pažeráka (trubica spájajúca ústa so žalúdkom), pretože prehľtanie nikotínu môže zhoršovať príznaky týchto ochorení. Nikotín môže taktiež spôsobiť vznik vriedkov v ústach. Ak u vás dôjde k zhoršeniu príznakov, poradťte sa so svojím lekárom. V takomto prípade môžete prejsť na používanie lieku NLN, ktorý sa užíva inak, ako napríklad nikotínové náplasti.

Deti (mladšie ako 12 rokov)

Správna dávka pre dospelých by u malých detí mohla spôsobiť závažnú otaravu alebo viesť k úmrtiu. Preto je nevyhnutné, aby ste NiQuitin Freshmint vždy uchovávali mimo dohľadu a dosahu detí.

Iné lieky a NiQuitin Freshmint

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Ked' prestanete fajčiť, môže to ovplyvniť účinok ďalších liekov, ktoré užívate. Ak máte ohľadom tohto nejaké otázky alebo obavy, poraďte sa so svojím zdravotníckym pracovníkom.

Je to zvlášť dôležité, ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú:

- teofylín (na liečbu astmy)
- takrín (na Alzheimerovu chorobu)
- klozapín (na schizofréniu)
- ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby)

NiQuitin Freshmint a jedlo a nápoje

Kým máte žuvačku NiQuitin Freshmint v ústach, nejedzte ani nepite.

Kyslé nápoje (napr. ovocná šťava, káva alebo sóda) ovplyvňujú vstrebávanie nikotínu v ústnej dutine. Aby sa zaistilo dosiahnutie čo najlepšieho účinku, vyhnite sa pitiu takýchto nápojov približne 15 minút pred použitím žuvačiek NiQuitin Freshmint.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poraďte sa so svojím zdravotníckym pracovníkom predtým, ako začnete používať tento liek.

Fajčenie počas tehotenstva prináša riziká pre dieťa. Medzi tieto riziká patria spomalený rast plodu, predčasný pôrod alebo narodenie mŕtveho plodu. Najlepší spôsob ako zlepšiť vaše zdravie aj zdravie vášho dieťaťa je prestať fajčiť. Čím skôr prestanete fajčiť, tým lepšie.

Ak ste tehotná, v ideálnom prípade, by ste mali prestať fajčiť bez použitia NRT. Ale ak ste sa o to pokúsili a nepodarilo sa vám to, lekár vám môže odporučiť NRT ako pomoc pri odvykaní od fajčenia. Je to pre vaše vyvíjajúce sa dieťa lepšie, ako keby ste pokračovali vo fajčení. Rozhodnutie použiť NLN treba urobiť v čo najskoršom štádiu vášho tehotenstva. Mali by ste sa snažiť používať NLN iba 2 - 3 mesiace. Majte na pamäti, že najdôležitejšie je prestať fajčiť. Lieky typu žuvačiek môžu byť vhodnejšie ako nikotínové náplasti, pretože pri žuvačkách sa vám nikotín nedostáva do tela nepretržite. Náplasti však môžu byť vhodnejšie, ak trpíte napínaním na vracanie alebo vracaním.

Pri fajčení v období dojčenia spôsobuje tabakový dym dojčatám a deťom ťažkosti s dýchaním a iné problémy. V ideálnom prípade by ste mali prestať fajčiť bez použitia NRT. Ale ak ste sa o to pokúsili a nepodarilo sa vám to, lekár vám môže odporučiť NRT. Ak potrebujete použiť NLN ako pomoc pri odvykaní od fajčenia, množstvo nikotínu, ktoré sa môže dostať do tela vášho dieťaťa je malé. Najlepšie je používať lieky NRT, ktoré sa užívajú v určitých časoch počas dňa (napríklad žuvačky alebo pastilky, ako náplasti). Taktiež je lepšie dieťa dojčiť tesne predtým, ako použijete tento liek, pretože takto sa do tela vášho dieťaťa dostane najmenšie množstvo nikotínu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky žuvačiek NiQuitin Freshmint na schopnosť viest' vozidlá alebo obsluhovať stroje. Je však potrebné, aby ste zobraťi do úvahy, že odvykanie od fajčenia môže spôsobiť zmeny správania, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viest' vozidlá alebo obsluhovať stroje.

NiQutin Freshmint obsahuje

- sodík – tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej žuvačke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.
- sorbitol (E420) – Jedna 2 mg žuvačka obsahuje 148,65 mg sorbitolu. Jedna 4 mg žuvačka obsahuje 137,55 mg sorbitolu. Sorbitol je zdrojom fruktózy. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo ak vám bola diagnostikovaná dedičná neznášanlivosť fruktózy (skratka HFI, z anglického hereditary fructose intolerance), zriedkavé genetické ochorenie, pri ktorom človek nedokáže spracovať fruktózu, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako užijete alebo dostanete tento liek.●
butylhydroxytoluén (E321) – môže vyvolať lmiestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a sliznic.

3. Ako používať NiQutin Freshmint

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal zdravotnícky pracovník. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho zdravotníckeho pracovníka.

Pri pokuse odvyknúť si od fajčenia s podporou žuvačiek NiQutin Freshmint je dôležité, aby ste vynaložili maximálne úsilie prestať fajčiť. Ak však počas NLN predsa len vyfajčíte cigaretu, vo svojom pokuse odvyknúť si od fajčenia aj tak pokračujte. Ak je pre vás nadľaď ľažké prestať fajčiť, poradte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou, poradcom pre odvykanie od fajčenia alebo lekárnikom.

Žuvačky NiQutin Freshmint 2 mg sú určené pre fajčiarov, ktorí denne vyfajčia menej ako 20 cigaret. Žuvačky NiQutin Freshmint 4 mg sú určené pre fajčiarov, ktorí denne vyfajčia 20 alebo viac cigaret.

Nežujte žuvačku NiQutin Freshmint ako bežnú žuvačku. Ak sa žuvačka NiQutin Freshmint žuje príliš rýchlo a bez prestávok, nikotín sa uvoľňuje príliš rýchlo. To môže spôsobiť ľažkosti (napríklad pálenie záhy a čkanie).

Ked' chcete použiť NiQutin Freshmint, odstráňte papier a vytlačte jednu žuvačku. Potom si vložte žuvačku do úst a žuvačku pomaly žujte, až kým nepocítíte silnú chut' (asi po 1 minúte), potom žuvanie prerušte a žuvačku umiestnite medzi d'asno a líce. Ked' chut' zoslabne, žuvačku opäť niekol'kokrát požujte, až kým jej chut' nezosiľnie, potom žuvačku znova umiestnite medzi d'asno a líce. Po 30 minútach takéhoto používania bude žuvačka vyžuvaná. Ked' máte žuvačku v ústach, nejedzte ani nepite, pretože to môže znížiť vstrebávanie nikotínu. Nepoužívajte viac ako 15 žuvačiek denne. Ak by ste potrebovali používať NiQutin Freshmint celkovo dlhšie ako 9 mesiacov, musíte sa o tom poradiť so zdravotníckym pracovníkom.

Žuvačky NiQutin Freshmint sa môžu používať podľa nasledujúceho časového rozvrhu, ktorý je navrhnutý tak, aby ste postupne znižovali počet žuvačiek, ktoré používate.

Dospelí (vo veku 18 rokov a starší)

- Začnite s používaním 8 až 12 žuvačiek denne. Žuvačku žujte vždy, ked' máte chut' na cigaretu.
- Takto používajte žuvačky najviac 3 mesiace, potom postupne znižujte počet žuvačiek, ktoré denne použijete (pozrite tabuľku uvedenú nižšie).
- Ked' vám budú stačiť už len 1 až 2 žuvačky denne, pokúste sa prestať ich používať úplne.

Po odvyknutí od fajčenia sa môže stať, že niekedy pocítíte náhlu túžbu po cigarete. Ak sa vám to stane, môžete znova použiť túto žuvačku.

KROK č. 1	KROK č. 2	KROK č. 3
Začiatočná fáza liečby Žujte 1 žuvačku vždy, keď máte chuť na cigaretu. Používajte 8 - 12 žuvačiek/denne najviac 3 mesiace.	Fáza znižovania intenzity liečby Postupne znižujte počet žuvačiek až na 1 - 2 žuvačky/denne. Potom liečbu ukončite.	Podporná liečba Žujte jednu žuvačku, ak pocítite náhlu túžbu po cigarete.

Použitie u detí a dospevajúcich

Dospevajúci (vo veku 12 - 17 rokov vrátane)

Dospevajúci majú používať žuvačky NiQuitin Freshmint len na základe odporúčania lekára.

Neprekračujte uvedenú dávku. Počas používania žuvačiek NiQuitin Freshmint nefajčíte, ani nepoužívajte iný liek obsahujúci nikotín. Pozorne dodržiavajte pokyny a nepoužívajte viac ako 15 žuvačiek v priebehu jedného dňa (24 hodín).

Deti mladšie ako 12 rokov

NiQuitin Freshmint nesmú používať deti mladšie ako 12 rokov.

Ak cítite nutkanie znova začať fajčiť

Ak sa obávate, že možno znova začnete fajčiť alebo ak zistíte, že je pre vás ľažké úplne prestať používať žuvačky, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka. Ak predsa len znova začnete fajčiť, lekár vám poradí, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri ďalšej NLN.

Ak použijete viac žuvačiek NiQuitin Freshmint, ako máte

Ak použijete priveľa žuvačiek NiQuitin Freshmint, môže sa u vás objaviť napínanie na vracanie, závraty a celkový pocit choroby. Prestaňte používať žuvačky a bezodkladne sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom alebo chod'te na lekársku pohotovosť. Ak je to možné, lekárovi ukážte balenie žuvačiek NiQuitin Freshmint alebo túto písomnú informáciu.

Žuvačky nie sú vhodné pre deti mladšie ako 12 rokov. Ak žuvačky použijú deti, môžu sa u nich prejaviť známky predávkovania nikotínom. Medzi ne patria bolesť hlavy, vracanie, bolesť žalúdka a hnačka. Ak nejaké žuvačky použilo alebo zjedlo diet'a, bezodkladne sa obráťte na lekára alebo chod'te na najbližšiu lekársku pohotovosť, pretože to môže mať veľmi nebezpečné a dokonca smrteľné následky. Ak je to možné, lekárovi ukážte balenie žuvačiek NiQuitin Freshmint alebo túto písomnú informáciu.

Ak máte akékol'vek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa zdravotníckeho pracovníka.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zistilo sa, že ak sa NiQuitin Freshmint používa v odporúčaných dávkach, nespôsobuje žiadne závažné vedľajšie účinky.

Odvykanie od fajčenia samé o sebe môže spôsobovať príznaky, ako napríklad závraty, bolest' hlavy, poruchy spánku, kašeľ a príznaky podobné nachladnutiu. Príznaky, ako napríklad depresia, podráždenosť, úzkosť, zvýšená chuť do jedla a nespavosť, môžu taktiež súvisieť s abstinenčnými príznakmi vyskytujúcimi sa pri odvykaní od fajčenia.

Prestaňte používať žuvačky NiQuitin Freshmint a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov alergických reakcií, ktoré môžu byť závažné:

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- opuch tváre, jazyka alebo hrdla
- ťažkosti s prehľtaním
- žihľavka a ťažkosti s dýchaním
- nepravidelný tlkot srdca
- príznaky závažných alergických reakcií, ktoré zahŕňajú náhlu dýchavičnosť alebo tlak na hrudníku, vyrážky a mdloby

Ďalej sú uvedené ďalšie vedľajšie účinky - sú usporiadane podľa pravdepodobnosti ich výskytu.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- nevoľnosť

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- nepríjemný pocit v oblasti žalúdka a črev
- bolest' hrdla, bolest'/suchosť v ústach, podráždenie ústnej dutiny alebo vznik vriedkov v ústnej dutine, zápal hltana, kašeľ
- porucha spánku, bolest' hlavy, podráždenosť, závraty
- vracanie, čkanie, porucha trávenia, plynatosť, hnačka, zápcha
- bolest' čeľuste

Žiadny z uvedených vedľajších účinkov nie je závažný a často spontánne vymizne po niekoľkých dňoch liečby.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- zrýchlený tlkot srdca alebo uvedomovanie si tlkotu srdca
- ťažkosti s dýchaním, bolest' na hrudníku
- porucha/zmena vnímania chuti
- začervenanie kože, žihľavka, zvýšené potenie
- bolest' alebo opuch svalov/kĺbov
- zápal sliznice ústnej dutiny
- chvenie
- celkový pocit nepohody

Neznáme (časťosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- záchvaty (kŕče), ťažkosti s prehľtaním, grganie, zvýšené slinenie, slabosť (nedostatok energie), únava, ochorenie podobné chrípke (príznaky podobné chrípke), precitlivenosť, neobvyklé sny, svrbenie alebo vyrážka, strata citlivosti alebo brnenie v ústach

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať NiQuitin Freshmint

- **Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.**
- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
- Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred vlhkosťou.
- Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo NiQuitin Freshmint obsahuje

- Liečivo je nikotín. Každá žuvačka obsahuje 2 mg alebo 4 mg nikotínu (vo forme živicového komplexu nazývaného nikotínium-rezinát).
- Ďalšie zložky sú: butylhydroxytoluén (E321), sorbitol (E420), xylitol (E967), uhličitan vápenatý (E170), uhličitan sodný (E500), glycerol (E422), draselná soľ acesulfámu (E950), manitol (E421), arabská guma (E414), sukralóza (E955), oxid titaničitý (E171) a príchute: Optacool, eukalyptovo-mentolová a levomentolová.

Ako vyzerá NiQuitin Freshmint a obsah balenia

Biele až sivobiele žuvačky obdĺžnikového tvaru.

Každý blister obsahuje 4 alebo 10 žuvačiek.

Balenie obsahuje 4, 10, 30, 100 alebo 200 žuvačiek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Výrobca

Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, Dánsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko	NiQuitin freshmint 2 mg Gomme à mâcher médicamenteuse
	NiQuitin freshmint 4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse
Česká republika	NiQuitin Freshmint 4 mg léčivá žvýkací guma
Dánsko	NiQuitingum Mint medicinsk tyggegummi 2 mg
Estónsko	NiQuitingum Mint medicinsk tyggegummi 4 mg
	NiQuitin Mint

Fínsko	Niquitin Mint 2 mg lääkepurukumi Niquitin Mint 4 mg lääkepurukumi
Holandsko	NiQuitin Mint 2 mg Kauwgom NiQuitin Mint 4 mg Kauwgom
Chorvátsky	NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje
Írsko	NiQuitin Fresh Mint 2mg Medicated Chewing Gum NiQuitin Fresh Mint 4mg Medicated Chewing Gum
Litva	NiQuitin Mint 2 mg vaistinė kramtomoji guma NiQuitin Mint 4 mg vaistinė kramtomoji guma
Lotyšsko	NiQuitin Mint 2 mg Medicated Chewing Gum NiQuitin Mint 4 mg Medicated Chewing Gum
Luxembursko	NiQuitin freshmint 2 mg Gomme à mâcher médicamenteuse NiQuitin freshmint 4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse
Maďarsko	NiQuitin Menthol Fresh 2 mg gyógyszeres rágógumi NiQuitin Menthol Fresh 4 mg gyógyszeres rágógumi
Nórsko	Nicabate
Poľsko	NiQuitin Extra Fresh
Portugalsko	NiQuitin Mint 2 mg goma para mascar medicamentosa NiQuitin Mint 4 mg goma para mascar medicamentosa
Rakúsko	NiQuitin Minze 2 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi NiQuitin Minze 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi
Slovenská republika	NiQuitin Freshmint 2 mg liečivé žuvačky NiQuitin Freshmint 4 mg liečivé žuvačky
Spojené kráľovstvo	Nicabate Extra Fresh Mint 2 mg Medicated Chewing Gum Nicabate Extra Fresh Mint 4 mg Medicated Chewing Gum
Španielsko	NiQuitin Mint 2 mg chicles medicamentosos NiQuitin Mint 4 mg chicles medicamentosos
Švédsko	NiQuitin Mentolmint 2 mg medicinskt tuggummi NiQuitin Mentolmint 4 mg medicinskt tuggummi
Taliansko	NIQUITINACT 2 mg gomme da masticare medicate NIQUITINACT 4 mg gomme da masticare medicate

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2021.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobnejšie informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečív:
www.sukl.sk.